Supplementary Table 3. Comparison of sarcopenia using bioelectrical impedance analysis

Participants	None	Sarcopenia	Total
Male			
60–64	154 (83.7)	30 (16.3)	184 (100.0)
65–69	179 (83.3)	36 (16.7)	215 (100.0)
70–74	120 (76.4)	37 (23.6)	157 (100.0)
75–79	87 (68.5)	40 (31.5)	127 (100.0)
≥80	31 (39.2)	48 (60.8)	79 (100.0)
Female			
60–64	226 (82.2)	49 (17.8)	275 (100.0)
65–69	191 (80.6)	46 (19.4)	237 (100.0)
70–74	126 (72.4)	48 (27.6)	174 (100.0)
75–79	94 (66.7)	47 (33.3)	141 (100.0)
≥80	36 (42.4)	49 (57.6)	85 (100.0)
Male			
≥60	571 (74.9)	191 (25.1)	762 (100.0)
≥65	417 (72.1)	161 (27.9)	578 (100.0)
≥70	238 (65.6)	125 (34.4)	363 (100.0)
≥75	118 (57.3)	88 (42.7)	206 (100.0)
≥80	31 (39.2)	48 (60.8)	79 (100.0)
Female			
≥60	673 (73.8)	239 (26.2)	912 (100.0)
≥65	447 (70.2)	190 (29.8)	637 (100.0)
≥70	256 (64.0)	144 (36.0)	400 (100.0)
≥75	130 (57.5)	96 (42.5)	226 (100.0)
≥80	36 (42.4)	49 (57.6)	85 (100.0)

The data is presented as N (%).